

***BRONCHIOLITE DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT
SIGNES D'EXCLUSION DE PRISE EN CHARGE DE CET ENFANT***

ATTENTION CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE, ELLE EST INDICATIVE, C'EST UNE AIDE À L'ETABLISSEMENT DE VOTRE BILAN, LA PRISE EN CHARGE RELEVE DE VOTRE DECISION

- Geignements
- Pâleur cutanée avec sueurs front et tempes = hypercapnie
- Cyanose péribuccale
- Sa < 94%
- Alimentation < 50% sur la prise de 2 ou 3 repas successifs
- Fièvre > 38°5 = attention aux risques de convulsions, en sachant que notre séance augmente la température → traitement antipyrétique
- Fréquence cardiaque > 180 et < 100 = hospitalisation (100 < N < 140)
- Fréquence respiratoire > 60-65 = hospitalisation ou
< 25 = bébé épuisé = hospitalisation
- Existence tirage sus sternal
- Balancement thoraco-abdominal Type II : l'abdomen monte puis les muscles intercostaux insp et expi lâchent ; le thorax s'enfonce = hospitalisation
- Battements des ailes du nez (BAN) rapides et fréquents = hospitalisation
- Test à la tétée digitale : bébé n'a pas faim ou tétée molle → hypotonicité
- Hypotonie de la tête
- Agitation anormale par rapport à l'état habituel de l'enfant
- Pli cutané au niveau du cou : si le pli reste = déshydratation